

Sur une maladie particulière des Veines
par M. Chaumet associé de l'Académie

M. Brardot, M. Leryille & moi avons été
chargés par l'Académie pour lui rendre compte
d'un mémoire que M. Chaumet a lu à l'Académie: il y établit le caractère d'une maladie
particulière des Veines: Cette maladie qui est
tombée plusieurs fois sous les yeux des praticiens
n'avait point encore été observée avec toute l'attention
convenable pour la faire connoître; Et, en ne
s'occupant que de l'effet qui en résultait, on en
ignoroit absolument la cause: Elle consiste
principalement en une tumeur plus ou moins
volumineuse formée par l'amas du sang sorti
d'une ~~ouverture~~ ^{ouverture} faite au tronc principal
d'une Veine située profondément. Cette connoissance
a donné occasion à M. Chaumet de faire un
état de comparaison entre les maladies des
artères & celles des Veines; Et si l'on a établi des
différences entre les anévrysmes, il en établit
de même entre les affections qui arrivent aux
Veines. Sans prendre en considération les Varices
qui ne sont que des dilatations des Veines &
Subcutanées, Les Echymoires, Les thrombus, il



S'occupe particulièrement des différens Etats de
la tumeur dont il s'agit, de sa cause & des
signes qui la font connoître: il croit qu'aucun
auteur n'en a parlé spécialement, & c'est dans
la pratique seule qu'il en a trouvé quelques
Exemples: Cette tumeur ^{diffère des Varices} de la Varice, en ce que
la Varice n'est qu'une dilatation de la veine, &
que dans le cas présent, la tumeur est formée
par le sang hors de la veine; Elle est médiocre
dans son commencement, mobile, circonscrite,
sans changement de couleur à la peau, sans
douleur et sans dureté, Elle fait ensuite des
progrès très considérables; & quoiqu'on y sente
une sorte de fluctuation, on ne peut la prendre
pour un anévrysme, n'ayant point de battement
et pulsation, ni pour un dépôt Suppuré
n'étant point accompagné de douleur, ni des
autres symptômes qui doivent la précéder.
C'est d'après la connoissance qu'il a acquise de la
nature de cette ~~maladie~~ espèce de tumeur que M.
Chaussier a jugé à propos de la désigner sous
les noms de Thrombus Chronique, ou Varice
Capulaire, Varice Enkistée.

Je vous explique la cause primitive de cette
maladie, M. Chaumier présume avec raison
que quelques coups, chutes, ou efforts violens, ayant
affecté une partie de la veine, l'ont affoibli au
point qu'il s'est fait rupture en cet endroit,
que les enveloppes ou gaine de la veine se sont
dilatées peu à peu par l'impulsion du sang,
et qu'ensuite la cavité, devenant plus ou moins
considérable, le sang s'écoula, comme dans
un kiste, formoit la tumeur qui contenoit
des caillots & beaucoup de sérosité sanguino-
sente, comme on le voit arriver dans l'écoulement
faux ou vrai épanchement, ainsi qu'il est
prouvé par deux observations qu'il rapporte
dans son mémoire



Au mois de mars 1780 on amena
dans l'hôpital une femme âgée de 52 ans;
Elle portoit à la cuisse une tumeur très conside-
rable; comme la fluctuation de la matière
qu'elle contenoit étoit fort sensible, on en fit
l'ouverture; il en sortit, ~~une~~ ^{une} assez grande
quantité, un fluide épais & légèrement brunâtre,
En comprimant la tumeur, il en sortit des
caillots mêlés de filaments sanguins; Enfin

Le sang clair & pur sortit en nappe; Etonné
de cette évacuation sanguine, on se contenta
de remplir la cavité avec beaucoup de charpie
pour arrêter l'hémorragie; Et tout fut soutenu
d'un bandage, mais Evain; Le sang pénétra
tout l'appareil, & la malade épuisée mourut
Le soir même. Après la mort le tumeur fut
Examiné avec attention: On trouva une
grande quantité de caillots dans la cavité,
Et on évalua à Environ six livres Le sang
qu'elle pouvoit contenir avant l'opération;
Elle étoit bornée & circonscrite par une sorte
de Kiste formée par l'affaissement successif
des lames du tissu cellulaire; La plus part
des muscles qui couvrent la cuisse étoient
déplacés & amincis: Vers la partie moyenne
de la cuisse, au centre de la tumeur, La veine
Crurale avoit dans sa partie antérieure une
ouverture ovale, Longue de six lignes dont
les bords légèrement renversés en dehors
formoient une sorte d'entonnoir; au dessus
Et au dessous la veine avoit conservé son calibre
Naturel.

La Seconde observation n'est pas moins
intéressante: Au mois d'août 1789 M^r
Chaussier fut appelé par un homme en
s'agenouillant qui portoit à la cuisse droite
une tumeur d'un volume énorme, située à la
partie antérieure et s'étendant depuis
l'aîne jusqu'à près de la rotule: Elle avoit
32 pouces de circonférence: Dans cet état
elle causoit beaucoup de douleur au malade,
à cause de l'extrême distension des muscles
au dessous des quels elle étoit située; Elle étoit
molle, souple avec fluctuation sensible, sans
changement de couleur à la peau, sans chaleur
et sans pulsation. Au mois de mars précédent
après une marche forcée, le malade s'aper-
çut d'une tumeur à la cuisse de la grosseur
d'un œuf et qu'il attribuoit à un effort qu'il
avoit fait; il fut traité dès lors avec des
remèdes froids et des cataplasmes émolliens
appliqués sur la partie, ce qui disposa la
tumeur à acquies le volume énorme où
M^r Chaussier la trouva. soupçonant que
cette maladie pourroit ^{être} semblable à celle



Dont il avoit connoissance; il fit d'abord Suppri-
-mer les cataplasmes & prescrivit une potion
Sedante. Le lendemain, dans une consultation
qui fut faite, un des confères, croyant que
c'étoit une tumeur enkistée en fonte, proposa
d'appliquer un caustique sur la partie la plus
saillante de la tumeur; M. Chaussier s'y
opposa, & ramena son confère à son avis par
des raisons qui prévalurent. Dans l'état d'équi-
-sèment où étoit le malade, M. Chaussier se
determina à faire la ponction à la tumeur pour
s'assurer de la nature du fluide contenu: il en
Sortit environ une livre d'un fluide muqueux,
brunâtre, & semblable à un café léger qui ne
tarda pas à se coaguler; Le fluide qui s'évacua
ensuite étoit moins brun; Enfin le sang par
parut: alors il retira la canule, & fit comprimer
la tumeur par les mains d'un aide, mais n'étant
pas assez exacte, le sang y afflua de nouveau:
il y appliqua des compresses trempées dans une
décoction de roses de provins bouillies dans le vin,
& soutenues d'un bandage suffisamment conten-
-tif: Le malade vit mieux pendant un
certain tems; Mais dans un Supplément que

M. Chaussier a l'envoyé depuis à l'Académie,
il rend compte de cette intéressante maladie.

Depuis le mois d'août jusqu'à la mort du
glorieux malade fut soulagé par les Moyens &
Emplois; mais un rhume qui lui survint, donna
occasion à la tumeur d'augmenter & de s'étendre
du côté du Ventre & de la rotule; La fièvre lente
survint & une infiltration séreuse qui augmenta
considérablement partout le corps, accompagné
d'un dévoiement colligatif. Emporta le malade
Le 1^{er} janvier suivant.

Car l'ouverture de la tumeur qui fut faite
après la mort, on trouva dans cette énorme
cavité une très grande quantité d'air & de l'écume si
âcre que l'instrument dont on s'étoit servi, en
fut affecté; Elle contenait beaucoup de caillots
mous, entre autres un de la grosseur d'une tête
d'Enfant; On trouva dans le Centre deux caillots
du sang rouge & vermeil; La totalité pourroit
être évaluée à 17 ou 18 Lixres: Dans la paroi
interne du cercle vers la milieu de la circonférence, on
remarque une ouverture ovale de 4 lignes de
longueur, dans laquelle on pourroit introduire
l'extrémité du petit doigt; En y introduisant



un stilet on reconnut qu'elle étoit à la veine
Gurale, ce qui fut confirmé par la dissection
qui en fut faite.

Pour prouver que cette rupture des veines
peut se faire en toute autre partie qu'à une
Extrémité, M. Chaussier en rapporte un
Exemple. Un particulier, en faisant des efforts
pour aller à la selle, sentit tout à coup une
douleur vive au Scrotum du côté gauche;
La partie devint enflée de la grosseur du
poing, ~~de couleur~~ Noire & Echymosée; Des
Compresses trempées dans une solution
saline animée d'Eau de Vie camphrée
dissiperent l'Echyrose au bout d'une douzaine
de jours, mais il resta au cordon spermatique
une grosseur du Volume d'un œuf, qui
augmentoît peu à peu & gênoit beaucoup
le malade: M. Chaussier jugea à propos
de l'ouvrir, après avoir essayé l'usage d'autres
moyens; il en sortit environ quatre onces de
Sang brunâtre & en partie coagulé: un
Bouillonnet trempé dans une Légère solution
de Nitriol & placé dans le fond de la plaie,

Suffit pour arrêter l'écoulement
du sang & dans l'espace de quinze jours le
malade fut guéri.

On ne peut disconvenir que les faits
rapportés dans ce mémoire ne soient fort
intéressants; il n'y a rien à ajouter aux
réflexions judicieuses qui y sont répandues,
Et nous conviendrons avec M. Chaussier que
ces sortes de rupture peuvent arriver plus
particulièrement aux veines des Extrémités
par des coups, des Chutes ou des Efforts violens
qui agissent plus puissamment sur ces
Vaisseaux à cause des Valvules qui se trouvent
dans leur intérieur, & qui s'opposant au
retour du sang sur lui même, font que le
sang fait un plus grand Effort sur les parois
de la Veine. D'ailleurs, cette maladie étant
bien connue, nous croyons que la conduite
que l'on doit tenir dans son traitement doit
être la même que celle que l'on pratique
pour les artères dans l'anévrysme faux.
La ligature de la Veine ne peut être suivie
d'aucun inconvénient ni d'angue; Les Veines



Collatérales sont beaucoup plus nombreuses, et
rien ne peut s'opposer au retour du sang.
Nous croyons que le mémoire de M.
Chaurier mérite d'être accueilli, et que
l'académie peut faire usage de ses
observations.

Periille Prados Lemaire



